INFORMATIVO TÉCNICO Nº2/2018

Torrãozinho *Aracanthus mourei*

A cultura da soja é atacada por diversas pragas que ano a ano vem trazendo grandes perdas, algumas pragas que não tinha grandes importâncias hoje causa elevados danos á cultura. Um exemplo destas pragas que vem aumentando o ataque às lavouras nas ultima safras é o torrãozinho *Aracanthus mourei.*

Besouro cinza escuro ou marrom, corpo oval, geralmente seu dorso fica sujo de terra, que aderida ao seu corpo os deixam com aparência de uns torrões de terra (Figura 1). Os adultos têm o hábito de se jogar no solo e fingir de mortos quando perturbados.



Figura 1. Torrãozinho *Aracanthus mourei*

O ataque desta praga ocorre geralmente na fase inicial da cultura o que pode acarretar em elevados danos.

Apresenta maiores atividades durante a noite e dias com baixa luminosidade, os principais sinais são folhas atacadas com margens recortadas ou com perfurações, podem se alimentar de cotilédones, hastes e gemas levando às plantas atacadas a morte (Figura 2).



Figura 2. Plantas atacadas por torrãozinho *Aracanthus mourei.*

Dezembro/2018

Publicação de difusão tecnológica e Científica editada pela ProTec consultoria Agropecuária e Pesquisa dirigida a produtores rurais, técnicos, estudantes e demais profissionais envolvidos na meio agrícola.

Equipe técnicaProTec:

Ernane Vogt R. da Silva
Eng. Agr. Consultor/Pesquisador

Wagner J. De Oliveira
Tec.Agropec. Consultor/Pesquisador

Valdir K. Dadalt
Gerente Administrativo.

Hirslei Marcio
Eng. Agr. Agricultura de Precisão.

Janiel S. Chaves
Eng. Agr. Pesquisador.

Cinthia L. Emiliani
Bióloga Pesquisadora.

Camila Barreto de Oliveira
Eng. Agr. Pesquisador.

Willian J. de Oliveira
Tec. Agropec. Consultor.

Jorge L. D. de Araújo
Tec. Agropec. Consultor.

Sidinei Malaguti
Auxiliar de Campo.

Michelli R. de Oliveira
Auxiliar Administrativo.

Eliane C. do Carmo
Auxiliar Patrimonial.

As principais formas de controle do inseto, esta no uso de inseticidas para tratamento de sementes, com o objetivo do controle inicial da praga visto que e a fase da cultura que eles provocam maior danos. As aplicações de produtos em pós-emergência da cultura quando a praga atingir o nível de controle, sempre utilizando produtos que seja registrado para manejo da praga no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.



Figura 3. Torrãozinho *Aracanthus mourei*

Fale Conosco:
PROTEC CONSULTORIA AGROPECUÁRIA
São Gabriel do Oeste – MS.
Avenida: Getúlio Vargas, nº1513 – Centro
Fone: (67) 3295 -6230
www.protecms.com.br
pesquisa@protecms.com.br